


# ACEDICON



# GEGEN

# HUSTEN



# ACEDICON

GEGEN HUSTEN UND SCHMERZEN

Tabletten  
Ampullen  
Pulver zur Rezeptur

## INDIKATIONEN:

**HUSTEN** jeder Aetiologie, Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis, Pneumonie, Grippe, Pleuritis, Bronchiektasie, Tuberkulose der Lunge und des Kehlkopfes.

## SCHMERZZUSTÄNDE

mittleren Grades, insbesondere solche, bei denen die leichteren Analgetika nicht mehr ausreichen und das stärkste Analgetikum noch nicht nötig oder aus anderen Gründen noch nicht indiziert ist.

## WIRKSAMKEIT:

Hustenstillung: 5 mal so stark wie Codein  
Schmerzstillung:  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  so stark wie Morphin

## DOSIERUNG:

Bei Nichtbettlegerigen ist eine halbe Tablette in jedem Fall ausreichend;  
bei Bettlegerigen  $\frac{1}{2}$ -1 Tablette;  
bei Schmerzzuständen  $\frac{1}{2}$ -1 Ampulle ev. 1 Tabl.  
Rezepte umseitig.

### Für Kinder

vom 3. Jahr an die dem Alter entsprechende Codeindosis dividiert durch fünf, d. h.  
vom 3. - 4. Jahr 0,2-0,4 mg (0,0002-0,0004 g)  
" 5. - 7. " 0,6-1,0 mg (0,0006-0,001 g)  
" 8.-12. " 1,0-2,0 mg (0,001-0,002 g)

Man verordne: 1 Tablette (= 5 mg) auflösen in 100 ccm Zuckerwasser. Dann enthält:

1 Teelöffel  $\frac{1}{4}$  mg  
2 Teelöffel  $\frac{1}{2}$  mg  
1 Eßlöffel  $\frac{3}{4}$  mg

# ACEDICON



# Warum ACEDICON verordnen?

**ACEDICON** ist wirklamer als Codein  
und daher billiger im Gebrauch.

**ACEDICON** beeinträchtigt die motori-  
sche Darmtätigkeit in keiner Weise.

**ACEDICON** hat bei optimaler Dosierung,  
d. h. bei einer gerade ausreichend  
wirklamen minimalen Dosis keine  
Nebenwirkungen.

**ACEDICON** wird auch von alkaloid-  
empfindlichen Personen infolge der  
Wirklamkeit der kleinsten Dosen in  
der Regel gut vertragen.

## HANDELSFORMEN UND PREISE:

ACEDICON-PULVER: für die Rezeptur (Rezepte umfeitig)

ACEDICON-TABLETTEN:

Röhrchen mit 10 Stück zu 0,005 g	RM. 0,90
" " 20 " " 0,005 g	" 1,40
Klin.-Pckg. " 200 " " 0,005 g	" 7,95

ACEDICON-AMPULLEN:

Schachtel mit 5 Stück zu 0,01 g	RM. 2,05
" " 10 " " 0,01 g	" 3,65
Klin.-Pckg. " 100 " " 0,01 g	" 22,20

Hier abschneiden

Kostenfreie Proben und Literatur von

# ACEDICON-TABLETTEN -AMPULLEN

wünscht zu erhalten:

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Bitte Unterschrift  
und Stempel



# R E Z E P T E

Bei Bronchitis, Grippe, Pleuritis, Tuberkulose, Pertussis, neuralgischen Schmerzen ulw.  
je nach Lage des Falles:

**Rp.**

Acedicon 0,002-0,005  
Sacch. lact. 0,3  
M. f. pulv. tal. dos. Nr. X

**S.** 1 Pulver abends oder  
2mal täglich

**Rp.**

Acedicon 0,002  
Acid. acet. salicylic. 0,3  
M. f. pulv. tal. dos. Nr. X

**S.** 1 Pulv. 1-2mal täglich

**Rp.**

Acedicon 0,01  
Sirup. simpl. 20,0  
Aq. dest. ad 200,0  
M. f. s.

**S.** 1 Tee- bis 1 Eßlöffel je  
nach Alter

**Rp.**

Acedicon 0,0025-0,005  
Dimethylaminophenyl-  
dimethylpyrazolon. 0,3  
M. f. pulv. tal. dos. Nr. VI

**S.** 1 Pulv. 2-3mal täglich

**Rp.**

Acedicon 0,002  
Ol. cacao q. s.  
f. supp. tal. dos. Nr. 6

**S.** 1 Zäpfchen abds. (auch  
mit Extr. Bellad. 0,02)

**Rp.**

Acedicon 0,002  
Cadechol 0,1  
Sacch. lact 0,2  
M. f. pulv. tal. dos. Nr. X

**S.** 1 Pulv. 2-3mal täglich

Kaffenzulassung

1546

DRUCKSACHE

C. H. BOEHRINGER SOHN A.-G.

HAMBURG 5

